

# PASOS EN ATENCIÓN INICIAL DE CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS - COVID19



Identifique – Aísle – Evalúe clínicamente – Informe

## Paso 1: Identifique

DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASO PROBABLE COVID-19		
CASO	CRITERIO CLÍNICO	CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO
<b>Criterios de caso 1 IRA GRAVE</b>	Paciente con tos y fiebre, con cuadro de <b>Infección Respiratoria Aguda Grave -IRAG</b> que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación	a. Historial de <b>viaje internacional</b> en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas b. Trabajador de la salud u otro personal que que haya tenido <b>contacto estrecho*</b> con <b>CASO CONFIRMADO</b> para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19)
<b>Criterios caso 2 IRA LEVE</b>	Paciente con IRA que no requiere hospitalización y presenta alguno de los siguientes síntomas más frecuentes: • Fiebre • Tos • Dificultad respiratoria • Dolor de garganta • Fatiga	c. Antecedentes de <b>contacto estrecho*</b> en los últimos 14 días con un <b>CASO CONFIRMADO</b> con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)  <b>CONTACTO ESTRECHO: Cualquier persona, con exposición no protegida, en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos</b>
<b>Criterios caso 3 IRA GRAVE SIN NEXO</b>	Persona con IRA (con fiebre y tos) no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario	Independiente de historia de viaje o contacto con casos COVID-19
<b>Criterios caso 4 MUERTE</b>	Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida	Independiente de historia de viaje o contacto con casos COVID-19
<b>Criterios caso 5 ASINTOMÁTICO</b>	ASINTOMÁTICO	Contacto estrecho de caso <b>confirmado COVID-19</b> que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 día posteriores a la última exposición no protegida.

Tomado de LINEAMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LA INTRODUCCIÓN DEL SARS-CoV-2 A COLOMBIA (Marzo 19/20) + INSTRUCTIVO PARA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA INTENSIFICADA DE IRA ASOCIADA AL NUEVO CORONAVIRUS (Marzo 26/20)  
Los criterios de definición de caso pueden cambiar según el comportamiento epidemiológico del evento y consideraciones de cada país.

## Paso 2: Aísle


PACIENTE:	TRABAJADORES: Lavado de manos repetidamente +		
→ Mascarilla convencional para él y para su acompañante. → Higiene manos con gel alcoholado → Ubique en Área separada.	<b>Contacto directo SIN procedimientos que generan aerosoles:</b> → Mascarilla quirúrgica → Visor, careta o monogafas. → Bata manga larga anti fluido. → Guantes no estériles. → Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno → Opcional: Gorro	<b>Contacto directo CON procedimientos que generan aerosoles:</b> → Respirador N95 → Visor, careta o monogafas. → Bata manga larga antiluido. → Guantes no estériles. → Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno → Opcional: Gorro	<b>Áreas administrativas con contacto con pacientes:</b> → Mascarilla quirúrgica
<b>ACOMPAÑANTE:</b> → Mascarilla quirúrgica → Bata → Guantes			

## Paso 3: Evalúe Clínicamente

### EVALÚE CLÍNICAMENTE

→ Defina severidad

- Indagar **Factores de riesgo** para presentar cuadro más severo por infección por SARS-CoV-2
- Tener 60 o más años.
  - Diabetes
  - Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV)
  - Enfermedades respiratorias crónicas
  - Cualquier inmunodeficiencia
  - VIH
  - Cáncer
  - Uso de corticoides o inmunosupresores
  - Mal nutrición (obesidad y desnutrición)
  - Fumadores



Tomado de : Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia. ACIN – IETS Marzo/20

## Paso 4: Informe

### INFORME

- » Reporte el caso dentro de la institución (jefe de turno, salud pública).
- » Cumpla con procesos de notificación normativos (Colombia Fichas INS 346 o 348)
- » Estudio de contactos.

### Cuadro de acciones según definición de caso

Caso	Criterio Epidemiológico	Criterio Clínico	Acciones			
			Hospitalizar	Aislamiento Domiciliario	Prueba COVID	Reporte
Caso 1 "GRAVE"	+	+	✓		✓	Ficha 348
Caso 1 "LEVE"	+	+	Considerar Riesgos	✓	✓	Ficha 346
Caso 3 "GRAVE SIN NEXO"	-	+	✓		✓	Ficha 348
Caso 4 "MUERTE"	-	+			✓	Ficha 348
Caso 5 "ASINTOMÁTICO"	+	-		✓	✓ 7 días post-exposición	Ficha 346