

PASOS EN ATENCIÓN INICIAL DE CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS - COVID19



Identifique – Aísle – Evalúe clínicamente – Informe

Paso 1: Identifique

DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASO PROBABLE COVID-19		
CASO	CRITERIO CLÍNICO	CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO
Criterios de caso 1 IRA GRAVE	Paciente con tos y fiebre, con cuadro de Infección Respiratoria Aguda Grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación	a. Historial de viaje internacional en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas b. Trabajador de la salud u otro personal que que haya tenido contacto estrecho* con CASO CONFIRMADO o PROBABLE para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19)
Criterios caso 2 IRA LEVE	Paciente con IRA que no requiere hospitalización y presenta alguno de los siguientes síntomas más frecuentes: • Fiebre • Tos • Dificultad respiratoria • Dolor de garganta • Fatiga	c. Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un CASO CONFIRMADO con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) CONTACTO ESTRECHO: Cualquier persona, con exposición no protegida, en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos
Criterios caso 3 IRA GRAVE SIN NEXO	Persona con IRA (con fiebre y tos) no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario	Independiente de historia de viaje o contacto con casos COVID-19
Criterios caso 4 MUERTE	Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida	Independiente de historia de viaje o contacto con casos COVID-19
Criterios caso 5 ASINTOMÁTICO	ASINTOMÁTICO	Contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 día posteriores a la última exposición no protegida.

Tomado de LINEAMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LA INTRODUCCIÓN DEL SARS-CoV-2 A COLOMBIA (Marzo 19/20) + INSTRUCTIVO PARA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA INTENSIFICADA DE IRA ASOCIADA AL NUEVO CORONAVIRUS (Abril 4/20)
Los criterios de definición de caso pueden cambiar según el comportamiento epidemiológico del evento y consideraciones de cada país.

Paso 2: Aísle


PACIENTE:	TRABAJADORES: Lavado de manos repetidamente +		
→ Mascarilla convencional para él y para su acompañante. → Higiene manos con gel alcoholado → Ubique en Área separada.	Contacto directo SIN procedimientos que generan aerosoles: → Mascarilla quirúrgica → Visor, careta o monogafas. → Bata manga larga anti fluido. → Guantes no estériles. → Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno → Opcional: Gorro	Contacto directo CON procedimientos que generan aerosoles: → Respirador N95 → Visor, careta o monogafas. → Bata manga larga anti fluido. → Guantes no estériles. → Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno → Opcional: Gorro	Áreas administrativas con contacto con pacientes: → Mascarilla quirúrgica
ACOMPÑANTE: → Mascarilla quirúrgica → Bata → Guantes			

Paso 3: Evalúe Clínicamente

EVALÚE CLÍNICAMENTE

→ Defina severidad

- Indagar **Factores de riesgo** para presentar cuadro más severo por infección por SARS-CoV-2
- Tener 60 o más años.
 - Diabetes
 - Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV)
 - Enfermedades respiratorias crónicas
 - Cualquier inmunodeficiencia
 - VIH
 - Cáncer
 - Uso de corticoides o inmunosupresores
 - Fumadores



Tomado de : Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia. ACIN – IETS Marzo/20

Paso 4: Informe

INFORME

- » Reporte el caso dentro de la institución (jefe de turno, salud pública).
- » Cumpla con procesos de notificación normativos (Colombia Fichas INS 345, 346 o 348)
- » Estudio de contactos.

Cuadro de acciones según definición de caso

	Criterio Epidemiológico	Criterio Clínico	Acciones			
			Hospitalizar	Aislamiento Domiciliario	Prueba COVID	Reporte
Caso 1 "GRAVE"	+	+	✓		✓	Ficha 348
Caso 1 "LEVE"	+	+	Considerar Riesgos	✓	✓	Ficha 346
Caso 3 "GRAVE SIN NEXO"	-	+	✓		✓	Ficha 345
Caso 4 "MUERTE"	-	+			✓	Ficha 348
Caso 5 "ASINTOMÁTICO"	+	-		✓	7 días post-exposición ✓	Ficha 346